



La giardiose –
une parasitose
digestive courante de
l'homme et de l'animal



D'autres questions?
Dans ce cas, adressez-vous à votre
vétérinaire!

Timbre du cabinet:



Une zoonose – le parasite passe de l'animal à l'homme

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, un germe zoonotique est un germe qui se transmet de l'animal à l'homme. Les giardies remplissent ce critère.

Dans les pays occidentaux, la giardiose est une affection digestive courante.

L'homme s'infecte par contact avec des objets contaminés ou des individus infestés ou via une eau de boisson souillée. Les mouches peuvent également déposer les parasites sur les aliments.

La giardiose de l'homme est une affection gastro-intestinale caractérisée par des diarrhées et des vomissements. Chez les enfants notamment, cette infection peut provoquer des violents symptômes et conduire à une malnutrition. En 2008, l'Institut allemand Robert Koch a recensé 4'763 cas de giardiose chez l'homme.¹⁾

Les giardies chez les chiens et les chats ne sont pas une exception

En cas de diarrhée, y regarder de plus près – une infection à giardies peut en être à l'origine, car les giardies et les ascarides sont des parasites intestinaux courants des chiens et des chats.

Les auteurs d'une étude allemande ont examiné des selles de chiens et de chats et ont constaté que 25% des chiens et 9% des chats présentaient une infection à giardies.²⁾

L'excrétion des parasites par les animaux représente la principale source de dissémination des giardies.



Reconnaître une infection à giardies et la traiter

Les symptômes chez le chien et le chat

Une giardiose se manifeste généralement par une diarrhée d'intensité variable, mais tenace. Les selles peuvent contenir des glaires, voire du sang. Parfois, il y a vomissements et amaigrissement.

Diagnostic

La détection des giardies se fait à l'aide d'un examen de laboratoire rapide.

Pour réaliser ce test, votre vétérinaire a besoin d'un échantillon de selles.

Il existe différentes possibilités thérapeutiques, certaines sont également efficaces contre les verminoses.

En cas de diarrhée, y regarder de plus près – une giardiose peut en être à l'origine

Mesures d'hygiène générales

Les kystes de giardies excrétés restent infectieux pendant des semaines, voire des mois, dans l'environnement. Le risque de ré-infection est donc particulièrement élevé. Les mesures d'hygiène contribuent à éviter une ré-infection.

Pour de plus amples informations sur les infections à giardies ou à ascarides, adressez-vous à votre vétérinaire et à son équipe.

Protégez votre chien, votre chat et vous-même en ramassant les crottes de vos chiens lors de vos promenades. Veillez par ailleurs à couvrir les bacs de jeux après utilisation.

Protégez votre chien, votre chat et vous-même d'une giardiose

1) Infektionsepidemiologisches Jahrbuch meldepflichtiger Krankheiten für 2008, Robert Koch-Institut, Berlin, 2009

2) Heusinger A., Galián M. & Mueller E., Giardia sp, bei Hunden und Katzen in Deutschland. Vergleich der Ergebnisse von der mikroskopischen Untersuchung und einem Antigen Nachweis mittels ELISA.