



Commandez Scalibor® et exspot® pour la protection du chien et économisez jusqu'à 35 %

Action valable du 11.05. au 01.06.2020


	Produit	Art.	Durée (au moins jusqu'à)	Prix catalogue (CHF hors TVA)	Offre spéciale de remise		Quantité commandée
	Collier de protection petit (48 cm)	708925	02/2022	25.50	Dès 12 Dès 24 Dès 48 Dès 72	15 % 20 % 25 % 30 %	
	Collier de protection grand (65 cm)	708924	09/2022	29.60	Dès 12 Dès 24 Dès 48 Dès 72	15 % 20 % 25 % 30 %	
	Produit	Art.	Durée (au moins jusqu'à)	Prix catalogue (CHF hors TVA)	Offre spéciale de remise		Quantité commandée
	Spot-on	119068	12/2021	36.45	Dès 12 Dès 24 Dès 48	25 % 30 % 35 %	

Les rabais s'appliquent sur les prix unitaires courants et remplacent les prix échelonnés habituellement pratiqués. Les clients sous contrat bénéficient du prix contractuel pour autant que celui-ci soit inférieur au prix en action.

Options de commande

vet point vetpoint.ch

 order.ch.ah@merck.com

 058 / 618 14 14

 058 / 618 14 55

Timbre du cabinet:

Date, signature:

Scalibor® Protectorband: Collier antiparasitaire pour chiens contre les puces et les tiques ainsi que pour prévenir la leishmaniose et éviter les piqûres de moustiques de l'espèce Culex. **Principes actifs:** Deltaméthrine. **Indications:** prévention des infestations de puces (Ctenocephalides felis) pendant 4 mois et de tiques (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) pendant 6 mois; prévention des piqûres de phlébotomes (Phlebotomus perniciosus) pendant 5 - 6 mois (les phlébotomes étant les vecteurs de la leishmaniose); prévention des piqûres de moustiques (Culex pipiens pipiens) pendant 6 mois. **Posologie/mode d'emploi:** pour usage externe. Un collier par chien. Le collier peut être utilisé dès l'âge de 7 semaines. Ajuster au cou de l'animal en laissant juste deux doigts entre le collier et le cou de l'animal. Scalibor® Protectorband peut être utilisé chez les chiennes en gestation ou en lactation. **Contre-indications:** Ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 7 semaines, chez les chiens atteints de lésions cutanées étendues, ni chez les chiens qui présentent une hypersensibilité connue aux pyréthroides. **Ne pas utiliser chez les chats.** La deltaméthrine est extrêmement toxique pour les chats. Scalibor® ne doit en aucun cas être utilisé pour les chats. Des intoxications sévères peuvent en être la conséquence, caractérisées par des convulsions et des troubles locomoteurs pouvant se solder par la mort du chat. **Effets indésirables:** Dans des cas rares, une hypersensibilité peut provoquer une réaction cutanée locale et une chute des poils. Exceptionnellement, des symptômes neurologiques tels que tremblements ou absences peuvent survenir. Dans ces cas, il faut enlever le collier. Les symptômes disparaissent alors dans les 48 heures. Si les symptômes persistent, consultez un vétérinaire. Dans de tels cas, il est recommandé d'instaurer un traitement symptomatique au Diazepam. **Interactions:** Ne pas utiliser simultanément avec d'autres antiparasitaires externes contenant des organophosphorés. **Catégorie de vente:** D. **Titulaire de l'autorisation:** MSD Animal Health SARL, Lucerne. Informations complémentaires: Voir notice d'emballage ou sous www.tierarzneimittel.ch.

exspot® ad us. vet.: Solution insecticide à appliquer sur la peau des chiens. **Principe actif:** Permethrine. **Indication:** Lutte contre les puces, les tiques et les phlébotomes chez le chien. **Posologie/Mode d'emploi:** Ecarter le pelage et appliquer directement la quantité requise sur la peau entre les omoplates, à la base de la queue et/ou au milieu du dos. Chiens de 2.5 - 6.5 kg PC: 0.5 ml entre les omoplates; 6.5 - 15 kg PC: 1 ml entre les omoplates; 15 - 29 kg: 1 ml entre les omoplates et 1 ml à la base de la queue; plus de 30 kg PC: 1 ml entre les omoplates, 1 ml à la base de la queue et 1 ml au milieu du dos. **Contre-indications: Ne pas utiliser chez le chat!** Ne pas utiliser chez les chiots de moins de 2 semaines, ni chez les animaux malades ou convalescents. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'excipient. Ne pas appliquer en cas de lésions cutanées, notamment de la région dorsale. **Précautions:** Veiller à ce que l'animal ne lèche pas le site d'application. **Effets indésirables:** Dans de rares cas, une réaction d'hypersensibilité locale avec rougeur, démangeaisons, alopecie et formation de cloques peut apparaître au site d'application. Perte d'appétit, vomissements, fatigue, agitation, tremblements, convulsions, signes de paralysie et/ou ataxie figurent également parmi les symptômes courants. Ces effets indésirables sont généralement passagers et disparaissent en quelques heures si le chien est lavé avec de l'eau et du shampooing. Dans les cas plus graves, consulter un vétérinaire. **Interactions:** Ne pas utiliser exspot® simultanément avec d'autres insecticides tels que d'autres pyréthroides, des composés organophosphorés ou des carbamates. **Catégorie de vente:** B. **Titulaire de l'autorisation:** MSD Animal Health SARL, Lucerne. **Informations complémentaires:** Voir notice d'emballage ou sous www.tierarzneimittel.ch

Veuillez noter que les données personnelles nécessaires à la saisie et au traitement de cette procédure peuvent être enregistrées. Elles seront traitées de manière strictement confidentielle par MSD, conformément à la loi fédérale sur la protection des données (LPD). Pour de plus amples informations à ce propos, veuillez consulter notre politique de confidentialité sous <http://fr.msd-animal-health.ch/Protection-des-donnees.aspx>

Protégé par le droit d'auteur © 2020 Intervet International B.V., une société du groupe Merck & Co, Inc., Kenilworth, NJ, USA. Tous droits réservés.

MSD Animal Health GmbH, Weystrasse 20, CH-6006 Lucerne, www.msd-animal-health.ch